

JAK DZIAŁA UROLON®?


Urolon został zaprojektowany, aby zapewnić natychmiastowy efekt wypełniający, uszczelniający cewkę moczową i pomagając w przywróceniu trzymania moczu. Urolon jest z czasem całkowicie wchłaniany i wydalanany z organizmu, co oznacza, że w organizmie nie gromadzą się żadne jego pozostałości. Urolon jest wstrzykiwany wokół cewki moczowej, blisko szyjki pęcherza, aby pomóc uszczelnić cewkę moczową i przywrócić kontynencję. Wstrzyknięcie leku Urolon wykonuje się za pomocą cystoskopu, aby dokładnie określić miejsce wstrzyknięcia. Dla wygody można go podać w sedacji. Urolon jest zazwyczaj wstrzykiwany do ściany cewki moczowej w trzech miejscach.

Urolon to bioresorbowalny wypełniacz cewki moczowej, który umożliwia mało inwazyjne (ambulatoryjne) leczenie, nie wymagające znieczulenia ogólnego ani pobytu na noc w szpitalu.


CZY UROLON® JEST ODPOWIEDNI DLA CIEBIE?

Zanim będziesz w stanie odpowiedzieć na to pytanie, musisz uzyskać diagnozę WNM i wiedzieć, jakie opcje leczenia są dostępne. Najlepiej zrobić to rozmawiając ze swoim lekarzem, zwykle zaczynając od lekarza rodzinnego, a następnie uzyskując skierowanie do urologa, uroginekologa lub ginekologa. Jeśli jesteś jedną z wielu kobiet z NTM, ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem o dostępnych dla Ciebie opcjach.


PRZEKRÓJ PRZESZ CEWKĘ MOCZOWĄ



SPOSÓB DZIAŁANIA UROLON®



Urolon jest idealny dla kobiet z łagodnym do umiarkowanego NTM, które (jeszcze) nie chcą bardziej inwazyjnego zabiegu chirurgicznego lub nie mogą przechodzić operacji. Urolon został zaprojektowany jako minimalnie inwazyjna i długotrwała procedura, pozwalająca kobietom uwolnić się od ciężaru wkładek na nietrzymanie moczu, wstydu i obniżonej jakości życia związanej z nietrzymaniem moczu.



INFORMACJE

Poniżej znajduje się lista przykładowych zasobów informacji. W Internecie dostępnych jest wiele innych informacji ale pamiętaj, że ich najcenniejszym źródłem jest Twój lekarz.

- Brytyjskie Stowarzyszenie Chirurgów Urologicznych - www.baus.org.uk
- Holenderskie Towarzystwo Urologiczne - www.nvu.nl
- Holenderskie Towarzystwo Położników i Ginekologów - www.nvog.nl
- Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Kontynencji (USA) - www.nafc.org
- Królewskie Kolegium Położników i Ginekologów (RCOG) – www.rcog.org.uk

Aby uzyskać więcej informacji na temat wysiłkowego nietrzymania moczu i leku Urolon®, odwiedź witrynę urolon.com



... pomaga kobietom z nietrzymaniem moczu



PRZYCZYNY WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU

Do przyczyn NTM zalicza się:

- Ciążę i poród
- Niedobór hormonalny
- Otyłość
- Palenie tytoniu
- Nadmierne spożycie kofeiny lub alkoholu
- Długotrwałe działania wywołujące silny wpływ na organizm
- Przewlekły kaszel lub kichanie
- Wiek

Konieczne jest zasięgnięcie porady i pomocy w przypadku każdego stanu, który negatywnie wpływa na jakość życia, takiego jak NTM. NTM może obejmować utratę moczu od łagodnej do ciężkiej i może wpływać na wszystkie aspekty życia, takie jak interakcje społeczne, życie seksualne, zdolność do pracy, podróżowania i uprawiania sportu. Nie należy również lekceważyć wpływu fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

OPCJE LECZENIA

Istnieje wiele czynników związanych z NTM, jak również z opcjami leczenia. Ważne jest, aby zasięgnąć porady lekarskiej, szukając opcji leczenia dostosowanych do Twojego stanu. Wczesne leczenie objawów NTM może znacznie zmniejszyć ryzyko pogorszenia się stanu w nadchodzących latach. Najbardziej znane opcje leczenia NTM obejmują różne formy leczenia, od zachowawczego po chirurgiczne:

- Istnieje szeroka gama produktów i urządzeń zaprojektowanych w celu złagodzenia objawów nietrzymania moczu, ale nie leczących przyczyny. Obejmują one podkłady chłonne, ochronę łóżka i krzesła, cewniki, produkty do pielęgnacji skóry i higieny oraz specjalnie dostosowaną odzież.

Ćwiczenia mięśni dna miednicy (PMFE), znane również jako ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mające na celu wzmocnienie mięśni dna miednicy. Mięśnie te wspierają pęcherz i inne narządy, a ćwicząc i wzmacniając mięśnie dna miednicy, możesz zmniejszyć utratę moczu związaną z NTM. PFME to ćwiczenia niezbędne dla wszystkich kobiet, nie tylko w leczeniu objawów NTM. Mogą być korzystne w zmniejszaniu objawów łagodnego NTM, ale muszą być wykonywane konsekwentnie i prawidłowo.

- Zabiegi małoinwazyjne, takie jak (stałe) środki zwiększające objętość cewki moczowej.
Środki wypełniające cewkę moczową wstrzykuje się wokół cewki moczowej, skutecznie ją zwężając, a także zwiększając jej objętość i pozwalając jej wytrzymać wzrost ciśnienia podczas kaszlu, śmiechu, ćwiczeń itp.
- Zabieg chirurgiczny, taki jak założenie taśmy (syntetycznej siateczki), jest stosowany w celu przywrócenia podparcia pod pęcherzem i cewką moczową. Taśmy podcewkowe są obecnie najczęstszą procedurą chirurgiczną w leczeniu WNM, chociaż budzą coraz większe obawy względem długoterminowych powikłań. Wszystkie zabiegi chirurgiczne obejmują jedno lub więcej nacięć chirurgicznych. Zabieg chirurgiczny nie jest też rozwiązaniem dla wszystkich, ponieważ dana osoba może nie chcieć lub nie być w stanie poddać się zabiegowi chirurgicznemu, na przykład kobiety, które chcą mieć (więcej) dzieci lub kobiety w podeszłym wieku.

UROLON® - BIORESORBOWALNY WYPEŁNIACZ CEWKI MOCZOWEJ

Urolon ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy środkami zachowawczymi (np. podpaski, materiały do nietrzymania moczu i ćwiczenia mięśni dna miednicy) a chirurgicznymi (np. syntetyczne siatki/taśmy). Urolon leczy przyczynę NTM, pomagając uszczelnić cewkę moczową, której zamykanie słabnie w wyniku osłabienia tkanki łącznej i mięśni niezbędnych do utrzymania kontynencji, a także na skutek stopniowej utraty kolagenu w ścianach cewki moczowej. Utrata kolagenu to naturalny proces, który występuje w wyniku starzenia się, a w szczególności po menopauzie.

Urolon to nowa klasa środka wypełniającego, określanego jako bioresorbowalny implant cewki moczowej. Podobnie jak środki wypełniające cewkę moczową, jest on minimalnie inwazyjny i wstrzykiwany za pomocą cystoskopu w celu wizualnego potwierdzenia prawidłowego umieszczenia.

NIETRZYMANIE MOCZU

Nietrzymanie moczu (NTM) to niezamierzona i przypadkowa utrata moczu. Szacuje się, że ponad 200 milionów ludzi na świecie cierpi na NTM, z czego większość stanowią dorosłe kobiety. Istnieje kilka różnych typów nietrzymania moczu, przyczyn i metod leczenia.

Najczęstsze rodzaje nietrzymania moczu to wysiłkowe nietrzymanie moczu (około 50%), nietrzymanie moczu z parcia naglącego (około 20%) i nietrzymanie mieszane (około 30%). Ta ulotka koncentruje się na wysiłkowym nietrzymaniu moczu (WNM) i stosowaniu bioresorbowalnego wypełniacza cewki moczowej Urolon jako opcji leczenia dla dorosłych kobiet.

WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontynencji (ICS) definiuje wysiłkowe nietrzymanie moczu jako „skargę na mimowolny wyciek podczas wysiłku bądź podczas kichania lub kaszlu”. Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest bardzo powszechnym schorzeniem medycznym spowodowanym osłabieniem mięśni zwieracza cewki moczowej i mięśni dna miednicy, które są używane do utrzymywania zamkniętej cewki moczowej i trzymania moczu. To osłabienie prowadzi do wycieków moczu podczas kaszlu, kichania, śmiechu, ćwiczeń i innych czynności, które zwiększają ciśnienie (stres) wewnątrz brzucha; stąd nazwa Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu. Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest najczęstszą postacią nietrzymania moczu u kobiet. Około 1 na 3 kobiety w ciągu swojego życia doświadczy jakiejś formy wysiłkowego nietrzymania moczu.

JAK DZIAŁA UROLON®?

Urolon został zaprojektowany, aby zapewnić natychmiastowy efekt wypełniający, uszczelniając cewkę moczową i pomagając w przywróceniu trzymania moczu. Urolon jest z czasem całkowicie wchłaniany i wydalany z organizmu, co oznacza, że w organizmie nie gromadzą się żadne jego pozostałości. Urolon jest wstrzykiwany wokół cewki moczowej, blisko szyjki pęcherza, aby pomóc uszczelnić cewkę moczową i przywrócić kontynencję. Wstrzyknięcie leku Urolon wykonuje się za pomocą cystoskopu, aby dokładnie określić miejsce wstrzyknięcia. Dla wygody można go podać w sedacji. Urolon jest zazwyczaj wstrzykiwany do ściany cewki moczowej w trzech miejscach.

Urolon to bioresorbowalny wypełniacz cewki moczowej, który umożliwia mało inwazyjne (ambulatoryjne) leczenie, nie wymagające znieczulenia ogólnego ani pobytu na noc w szpitalu.

CZY UROLON® JEST ODPOWIEDNI DLA CIEBIE?

Zanim będziesz w stanie odpowiedzieć na to pytanie, musisz uzyskać diagnozę WNM i wiedzieć, jakie opcje leczenia są dostępne. Najlepiej zrobić to rozmawiając ze swoim lekarzem, zwykle zaczynając od lekarza rodzinnego, a następnie uzyskując skierowanie do urologa, uroginetologa lub ginekologa. Jeśli jesteś jedną z wielu kobiet z NTM, ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem o dostępnych dla Ciebie opcjach.


PRZEKRÓJ PRZEZ CEWKĘ MOCZOWĄ



SPOSÓB DZIAŁANIA UROLON®



Urolon jest idealny dla kobiet z łagodnym do umiarkowanego NTM, które (jeszcze) nie chcą bardziej inwazyjnego zabiegu chirurgicznego lub nie mogą mieć operacji. Urolon został zaprojektowany jako minimalnie inwazyjna i długotrwała procedura, pozwalająca kobietom uwolnić się od ciężaru wkładek na nietrzymanie moczu, wstydu i obniżonej jakości życia związanej z nietrzymaniem moczu.



INFORMACJE

Poniżej znajduje się lista przykładowych zasobów informacji. W Internecie dostępnych jest wiele innych informacji ale pamiętaj, że ich najcenniejszym źródłem jest Twój lekarz.

- Brytyjskie Stowarzyszenie Chirurgów Urologicznych - www.baus.org.uk
- Holenderskie Towarzystwo Urologiczne - www.nvu.nl
- Holenderskie Towarzystwo Położników i Ginekologów - www.nvog.nl
- Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Kontynencji (USA) - www.nafc.org
- Królewskie Kolegium Położników i Ginekologów (RCOG) – www.rcog.org.uk

Aby uzyskać więcej informacji na temat wysiłkowego nietrzymania moczu i leku Urolon®, odwiedź witrynę urolon.com



**Nie pozwól, aby
nietrzymanie moczu
Cię ograniczało**

www.urolon.com



NIETRZYMANIE MOCZU

Nietrzymanie moczu (NTM) to niezamierzona i przypadkowa utrata moczu. Szacuje się, że ponad 200 milionów ludzi na świecie cierpi na NTM, z czego większość stanowią dorosłe kobiety. Istnieje kilka różnych typów nietrzymania moczu, przyczyn i metod leczenia.

Najczęstsze rodzaje nietrzymania moczu to wysiłkowe nietrzymanie moczu (około 50%), nietrzymanie moczu z parcia naglącego (około 20%) i nietrzymanie mieszane (około 30%). Ta ulotka koncentruje się na wysiłkowym nietrzymaniu moczu (WNM) i stosowaniu bioresorbowalnego wypełniacza cewki moczowej Urolon jako opcji leczenia dla dorosłych kobiet.

NIETRZYMANIE MOCZU Z WYSIŁKU

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontynencji (ICS) definiuje wysiłkowe nietrzymanie moczu jako „skargę na mimowolny wyciek podczas wysiłku bądź podczas kichania lub kaszlu”. Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest bardzo powszechnym schorzeniem medycznym spowodowanym osłabieniem mięśni zwieracza cewki moczowej i mięśni dna miednicy, które są używane do utrzymywania cewki moczowej zamkniętej i trzymania moczu. To osłabienie prowadzi do wycieków moczu podczas kaszlu, kichania, śmiechu, ćwiczeń i innych czynności, które zwiększają ciśnienie (wysiłek) wewnątrz brzucha; stąd nazwa Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu. Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest najczęstszą postacią nietrzymania moczu u kobiet. Około 1 na 3 kobiety w ciągu swojego życia doświadczy jakiejś formy wysiłkowego nietrzymania moczu.

PRZYCZYNY WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU

Do przyczyn NTM zalicza się:

- Ciążę i poród
- Niedobór hormonalny
- Otyłość
- Palenie tytoniu
- Nadmierne spożycie kofeiny lub alkoholu
- Długotrwałe działania wywołujące silny wpływ na organizm
- Przewlekły kaszel lub kichanie
- Wiek

Konieczne jest zasięgnięcie porady i pomocy w przypadku każdego stanu, który negatywnie wpływa na jakość życia, takiego jak NTM. NTM może obejmować utratę moczu od łagodnej do ciężkiej i może wpływać na wszystkie aspekty życia, takie jak interakcje społeczne, życie seksualne, zdolność do pracy, podróżowania i uprawiania sportu. Nie należy również lekceważyć wpływu fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

OPCJE LECZENIA

Istnieje wiele czynników związanych z NTM, jak również z opcjami leczenia. Ważne jest, aby zasięgnąć porady lekarskiej, szukając opcji leczenia dostosowanych do Twojego stanu. Wczesne leczenie objawów NTM może znacznie zmniejszyć ryzyko pogorszenia się stanu w nadchodzących latach.

Najbardziej znane opcje leczenia NTM obejmują leczenie zachowawcze i chirurgiczne:

- Szeroka gama produktów i urządzeń zaprojektowanych w celu złagodzenia objawów nietrzymania moczu, ale nie leczących przyczyny. Obejmują one podkłádki chłonne, ochronę łóżka i krzesła, cewniki, produkty do pielęgnacji skóry i higieny oraz specjalnie dostosowaną odzież.

- Ćwiczenia mięśni dna miednicy (PMFE), znane również jako ćwiczenia mięśni Kegla, to ćwiczenia mające na celu wzmocnienie mięśni dna miednicy. Mięśnie te wspierają pęcherz i inne narządy, a ćwicząc i wzmacniając mięśnie dna miednicy, możesz zmniejszyć utratę moczu związaną z NTM. PMFE to niezbędne ćwiczenia dla wszystkich kobiet, a nie tylko w leczeniu objawów NTM. Mogą być korzystne w zmniejszaniu objawów łagodnego NTM, ale muszą być wykonywane konsekwentnie i prawidłowo.
- Zabiegi małoinwazyjne, takie jak (stałe) środki zwiększające objętość cewki moczowej.
 - Środki wypełniające cewkę moczową wstrzykuje się wokół cewki moczowej, skutecznie zewężając cewkę moczową, zwiększając jej objętość i pozwalając jej wytrzymać wzrost ciśnienia podczas kaszlu, śmiechu, ćwiczeń itp.
- Zabieg chirurgiczny, taki jak założenie taśmy (syntetycznej siateczki), jest stosowany w celu przywrócenia podparcia pod pęcherzem i cewką moczową. Taśmy podcewkowe są obecnie najczęstszą procedurą chirurgiczną w leczeniu WNM, chociaż budzą coraz większe obawy względem długoterminowych powikłań. Wszystkie zabiegi chirurgiczne obejmują jedno lub więcej nacięć chirurgicznych. Zabieg chirurgiczny nie jest rozwiązaniem dla wszystkich, ponieważ dana osoba może nie chcieć lub nie być w stanie poddać się zabiegowi chirurgicznemu, na przykład kobiety, które chcą mieć (więcej) dzieci lub kobiety w podeszłym wieku.

UROLON® - BIORESORBOWALNY WYPEŁNIACZ CEWKI MOCZOWEJ

Urolon ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy zabiegami zachowawczymi

(np. podpaski, materiały dla nietrzymania moczu i ćwiczenia mięśni dna miednicy) a chirurgicznymi (np. syntetyczne siatki/taśmy). Urolon leczy przyczynę NTM, pomagając uszczelnić cewkę moczową, której zamykanie słabnie w wyniku osłabienia tkanki łącznej i mięśni niezbędnych do utrzymania kontynencji, a także na skutek stopniowej utraty kolagenu w ścianach cewki moczowej. Utrata kolagenu to naturalny proces, który występuje w wyniku starzenia się, a w szczególności po menopauzie.

Urolon to nowa klasa środka wypełniającego i jest określany jako bioresorbowalny implant cewki moczowej. Podobnie jak środki wypełniające cewkę moczową, jest on minimalnie inwazyjny i wstrzykiwany za pomocą cystoskopu w celu wizualnego potwierdzenia prawidłowego umieszczenia.